

DESARROLLO DEL BEBE MES A MES

MES 5

- Al completar el quinto mes de gestación la madre puede sentir los movimientos del bebé ya que el activo ser no nacido, patear y dar vueltas, incluso puede ser oído a través de la pared abdominal cuando tiene hipo. El bebé está abriéndose hacia un mundo de sensaciones y libertad y por eso patea con fuerza y alterna los períodos de actividad con otros de sueño y reposo. El desarrollo del bebé ha llegado a tal nivel, que de nacer en este momento podría sobrevivir como un niño normal.
- Una de las funciones que más desarrollo presenta el bebé en este período es la de escuchar. El aparato auditivo está prácticamente formado y el niño intrauterino empieza a establecer un vínculo auditivo.
- La importancia de este vínculo auditivo está documentado en una cantidad impresionante de estudios que comprueban que efectivamente los bebés muestran preferencia por la voz de la madre aún varias semanas después de nacer. Esta preferencia se establece mucho antes de nacer, desde su vida intrauterina.
- A partir de la decimoséptima semana, los cambios en el bebé intrauterino dejarán de ser tan complejos como en las semanas anteriores, empezarán a crecer más en tamaño, los ataques de hipo se hacen audibles y el feto copio permite oír los sonidos del corazón.

Te brindamos el mejor asesoramiento en masajes y desarrollo personal.

☎ Cel: (+57) 3105610941 ✉ E-mail: info@fundacionsemilla.com

- En ese estado de su desarrollo el bebé tiene un peso de 240 gramos y supera los 20 centímetros. Se ha completado su aparato auditivo y las manos son capaces de sujetar con fuerza, patear, se da vuelta y a veces llora de manera audible. Su sensibilidad táctil es similar a la de un niño de un año de edad y reacciona al oír música o ruidos fuertes y es capaz de diferenciar sonidos.
- Mientras tanto, en la futura madre los cambios también tienden a estabilizarse y si aún no ha notado los movimientos del bebé en este quinto mes deberá empezar a hacerlo. Serán frecuentes las contracciones irregulares e indoloras del útero, conocidas como contracciones de Baxton-Hicks; en caso de que sean dolorosas hay que comunicarlo de inmediato al ginecólogo.